

ไข้เลือดออก โรคร้าย ที่มี ยุงลาย เป็นพาหะ

อาการ

1. ไข้สูงลอย 39-40 องศา
ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะประมาณ
4-5 วัน
2. อาการเลือดออก ถ่ายดำ อาเจียน
มีจุดเลือดออกตามตัว
3. ตับโต กดเจ็บบริเวณชายโครงข้างขวา
4. ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ หรือ
อาการช็อก เกิดในช่วงไข้จะลด
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว
ซีพจรเบาและเร็ว ความดันต่ำ

การป้องกัน

1. ควบคุมสิ่งแวดล้อม
เพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
2. ป้องกันส่วนบุคคล ใส่เสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว ใช้ก๊ลิ้นกันยุงและใช้ยาฆ่ายุง
3. ใช้สารเคมีควบคุม ใช้ทรายอะเบท
ใช้ยาฆ่าลูกน้ำ ใช้สารเคมีพ่นตามบ้าน

ดูแลป้องกันมือของสมาชิกใน ให้สะอาด

1. ถ้าเด็กมีไข้สูง ควรเช็ดตัว
และให้รับประทานยาลดไข้
2. ควรให้เด็กดื่มน้ำมาก ๆ
หรือเครื่องดื่มมาก ๆ
3. ถ้ามีผู้ป่วยมีอาการ
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้
อาเจียน ใจสั่น หน้ามืด
ในช่วงไข้ลดให้รีบนำส่งรพ.ทันที
4. ถ้าดูแลเบื้องต้นดี เด็กยังมีไข้
เกิน 3 วัน ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที
5. แต่ถ้าเด็กอาเจียนมาก
ควรรีบปรึกษาแพทย์
6. ถ้าอาการไข้ลดลง แต่เด็กมีอาการซึม
ควรรีบนำส่งโรงพยาบาล



โรคไข้เลือดออก เกิดได้อย่างไร

เชื้อก่อโรค	: ไวรัสเด็งกี มี 4 สายพันธุ์ คือ DEN 1, DEN 2, DEN 3, และ DEN 4
พาหะนำโรค	: ยุงลาย (ยุงลายบ้าน และ ยุงลายสวน)
ระยะฟักตัวของโรค	: 5 - 8 วัน

วงจรการเกิดไข้เลือดออก



การควบคุมป้องกัน ปราบยุงลายด้วยวิธี

2 ร. 5 ป.

พื้นที่เสี่ยง 2 ร.

หน่วยงานในพื้นที่ควรเร่งรัดรณรงค์
มาตรการ 2 ร. คือเร่งป้องกัน
ควบคุมโรค

- ร.1 โรงเรียน (บ้านพักอาศัย)
- ร.2 โรงเรียน



ด้วยการปฏิบัติ 5 ป.

ปิด

ปิดภาชนะที่ใส่น้ำให้สนิทไม่ให้
ยุงเข้าไปวางไข่

เปลี่ยน

เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน

ปล่อย

ปล่อยปลาในลูกน้ำในอ่างบัว เช่น
ปลาหางนกยูง

ปรับปรุง

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมกำจัดขยะ
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ปฏิบัติ

ปฏิบัติจนเป็นนิสัย

ใช้เกลือดอก

หยุดไข่เลือดออก
หยุดภัยใกล้ตัว



ด้วยความปรารถนาดี

จาก...ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง

โทรศัพท์ 0-732-89114

โทรสาร 0-7328-9091

WWW.BANNUNGSTA.GO.TH

**ไม่มอดข้ามยุคเวลา
มาตกร้ายในบ้านคุณ**

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อบต.บึงนาราง